



سمینار مطالعات بالینی و ایمنی دارو برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، در این همایش که با حضور جمعی از اساتید و متخصصان حوزه مطالعات بالینی و داروسازان، وارد کنندگان و تولیدکنندگان دارو در کشور برگزار شد، گواهی مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت Merck آلمان نیر ارایه گردید. این سمینار با هدف ارتقای دانش و تبادل تجربه در حوزه انجام مطالعات کارآزمایی بالینی متناسب با استانداردهای بین المللی (GCP)، اصول و ساختارهای لازم برای پایش عوارض جانبی دارو، اصول کلی GMP و جایگاه هر یک از این موارد در بحث تولید، ثبت، توزیع و تجویز دارو برگزار شد. رئیس دبیرخانه کمیته مطالعات بالینی سازمان غذا و دارو، رئیس مرکز کارآزمایی بالینی، سرپرست داروخانه های دانشگاهی دانشگاه تهران و رئیس مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران آخرین تجارب و دستاوردهای داخل و خارج از کشور را در رابطه با موضوعات مطروحه در سمینار بحث و بررسی کردند. احمد الشیمی فارموکولوژیست و مسئول کنگره شرکت MERCK در خاورمیانه، مایکل رایندل دکترای سم شناسی از آلمان و عامر الغبان فارموکولوژیست و دکترای مطالعات بالینی از جمله سخنرانان بین المللی این سمینار یک روزه بودند. این سمینار با همکاری علمی و اجرایی سازمان غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو و شرکت Merck آلمان برگزار شد.

اجتماعی(۳)۷۲۹۹*۱۴۷۸

کد خبر: ۱۲۲۰۸۳۷۹



عامل مرگ ۱۶ درصد از کودکان، نبود پزشک است

در حالی که کمتر از دو سال تا پایان تعهد ایران نسبت به اهداف ۸ گانه هزاره - مصوب سال ۲۰۰۰ - باقی مانده و هدف چهارم این مجموعه هم کاهش مرگ کودکان است اما آمارهای رسمی از وضعیت سلامت کودکان که می تواند در کاهش مرگ موثر باشد خبرهای خوبی نمی دهد علاوه بر آنکه دلایل جنبی هم منجر به افزایش مرگ کودکان شده و در مجموع دستیابی ایران به هدفی که نسبت به آن تعهد سپرده، در این فاصله زمانی بعید به نظر می رسد. چنانکه روز گذشته هم غلامرضا خاتمی؛ رییس انجمن پزشکان کودکان، در مراسم افتتاح نگره اورژانس و بیماری های شایع کودکان خبر داد که هم اکنون ۶ درصد کودکان کشور دچار سو [تغذیه هستند. البته این رقم، به زعم وی عدد بهبود یافته است زیرا تا پیش از سال ۱۳۷۴، تعداد کودکان مبتلا به [تغذیه در کشور، ۱۴ درصد کودکان را شامل می شده و امروز، پس از گذشت ۱۸ سال این رقم، کاهش یافته و ۵۰ درصد داشته اما همچنان این رقم نگران کننده است چنانکه خاتمی هم با اشاره به اینکه ناکافی بودن آگاهی خانواده ها و دسترسی نداشتن به مواد غذایی در برخی شهرها به ویژه نقاط محروم در کشور باعث جاد سو [تغذیه از نوع کمبود ریزمغذی ها در کودکان شده گفت: «فقر مالی نیز می تواند کودکان را از تغذیه صحیح دور کند. در نقاط محرومی چون سیستان و بلوچستان و اطراف استان کرمان شاهد میزان بیشتری از [تغذیه هستیم، چنانکه در استان سیستان و بلوچستان کمبود ریزمغذی ها همچون ویتامین B، A و D به ششم می خورد. اما سو [تغذیه در استان های شمالی کشور کمتر از سایر مناطق است.» علی اکبر سیاری؛ معاون بهداشتی وزیر بهداشت هم در این کنگره با بیان اینکه در فصل زمستان، بیماری های عفونی ویروسی بسیار شایع می شود، گفت: «اگر به این مورد به درستی توجه نکنیم، عفونت های ویروسی به عفونت های کتریایی تبدیل می شود. همچنین اگر کودک دچار سو [تغذیه باشد، در پی ابتلا به عفونت های ویروسی به عفونت های اسهالی نیز مبتلا خواهد شد.» هشدار معاون بهداشت می تواند نگرانی از باب کاهش نیافتن چشمگیر مرگ کودکان را به این سمت هدایت کند که برخی موارد مرگ به علت عفونت هایی اتفاق افتاده که ریشه در سو [تغذیه کودک داشته است. سیاری هم توضیح داد که: «کودکانی که با شوک به مراکز درمانی مراجعه می کنند، اگر یک ارگان در بدن آنها نارسایی داشته باشد، تا ۲۵ درصد دچار مرگ و میر می شوند، اگر دو

ارگان از بدن آنها درگیر باشد، احتمال مرگ و میر به ۶۵ درصد می رسد و اگر سه ارگان از بدن آنها نارسایی داشته باشد، احتمال مرگ را تا حدود ۸۵ درصد افزایش می دهد. ۱۰ الی ۱۲ درصد کودکان دچار تشنج می شوند و حوادث، شایع ترین علت مرگ و میر کودکان بالای چهار سال است. «وی همچنین اضافه وزن و چاقی را از مهم ترین عوامل زمینه ساز ابتلا به بیماری های غیرواگیر در کودکان دانست و افزود: «۲۰ درصد کودکان ایرانی دچار اضافه وزن هستند. همچنین ۸/۶ درصد کودکان دچار کوتاهی قد هستند که این آمار در کودکان زیر پنج سال استان سیستان و بلوچستان به ۲۰ درصد می رسد.» اما آمار نگران کننده یی که از سوی معاون بهداشتی وزیر بهداشت ارائه شد درباره وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های دانشگاهی و آموزشی به ودکان بود. اتفاقی که سیاری آن را به «سو □ مدیریت» تعبیر کرد و می تواند میراث برجای مانده از دولت دهم باشد. در حالی که علی اصغر پیوندی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۵ درصد مرگ و میر کودکان ک تا ۴ ساله را مربوط به حوادث و سوانح دانست و هشدار داد که ۷ درصد کودکان در معرض سو □ تغذیه ستند و کوتاه قدی شایع ترین علامت سو □ تغذیه است، سیاری در توضیح وضعیت نابسامان ارائه خدمات درمانی به کودکان مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی و دانشگاهی گفت: «۴۸ درصد مرگ کودکان طی سال های گذشته بر اثر حوادث ترافیکی بوده و وقتی از خانواده هایی که فرزندان شان فوت کرده اند علت فوت را پرسیدیم، ۲۷ درصد آنها عنوان کردند که به خاطر مشکل مالی درمان فرزندشان را دنبال نکرده اند و در مطالعه یی دیگر ۱۶.۵ درصد، علت فوت را عدم ویزیت فوری و در واقع نبود پزشک در بیمارستان های آموزشی نوان کردند که این بالاترین عدم حضور در بیمارستان های آموزشی است که به سو □ مدیریت بر می گردد که باید با مدیریت حل شود.» در حالی که به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هم اکنون تعداد کودکان ۱ تا ۶ ساله کشور، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و تعداد کودکان ۶ تا ۱۸ ساله هم ۶ میلیون نفر برآورد شده، وی در مقایسه شاخص های مرگ و میر کودکان با کشورهای پیشرفته صنعتی، ایران را یک کشور عقب افتاده معرفی کرد زیرا که هم اکنون تعداد مرگ کودکان کمتر از یک سال کشور، ۱۶ الی ۱۸ مورد در ۱۰ هزار تولد زنده است که این رقم در کشورهای صنعتی، ۵ در ده هزار تولد زنده گزارش شده است.

کد خبر: ۱۲۲۰۵۵۹۹

اخبار مرتبط:

✓ فرارو: نبود پزشک، عامل مرگ ۱۶ درصد از کودکان

✓ انتخاب: نبود پزشک، عامل مرگ ۱۶ درصد از کودکان